

## ANALIZA ANTROPOLOGICZNA MATERIAŁU KOSTNEGO Z CMENTARZYSKA W WYSZOMIERZU WIELKIM

Legenda : 1 – nr obiektu; 2 – masa (g); 3 – barwa; 4 – stopień przepalania; 5 – wiek; 6 – płeć; 7 – kości diagnostyczne; 8 – uwagi.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
108	321,7	beżowo- popielata	średni	<i>adultus</i> (25–35 lat)	F?	kości płaskie ze sklepienia czaszki (średniej grubości, gracylne); fragmenty nasad kości długich (zosyfikowane); fragmenty trzonów kości długich (ściany kanałów jam szpikowych dość grube; duże rozmiary), w tym kość piszczelowa (ostra krawędź przednia)	kości niejednoznaczne morfologicznie, z niewielką przewagą cech płciowych żeńskich
109A	536,7	beżowo- brązowa	średni	<i>adultus</i> (ok. 25 lat)	F	kości płaskie ze sklepienia czaszki (dość cienkie, gracylne, szwy otwarte); fragment górnej krawędzi oczodołu (ostra, gracylna); fragment z okolicy kąta żuchwy (słabo urzeźbiony, rozarty); 2 korzenie zębów stałych (małe, uformowane); fragment rzepki (nieduży); fragmenty nasad kości długich (zwarta istota gąbczasta, zosyfikowane); trzony kości długich (słabo urzeźbione, niezbyt dużych rozmiarów), w tym kości udowej (kresa chropawa słaba)	na kościach ślady żelazistych przebarwień
109B	2,2	popielato- biała	dość silny	dorosły (?)	?	trzy fragmenty kości, w tym kość płaska ze sklepienia czaszki (cienka, gracylna) oraz fragmenty trzonu i nasady kości długiej (dość dużych rozmiarów)	kości mało diagnostyczne, prawdopodobnie ludzkie
110	954,6	beżowo- popielata	średni	wczesny <i>maturus</i> (ok. 40 lat)	M	kości płaskie sklepienia czaszki (grube masywne, dobrze urzeźbione, widoczny początek obliteracji szwów), w tym łuska kości potylicznej (guzowatość potyliczna zewnętrzna dobrze zaznaczona, masywna), fragment łuku nadoczodołowego (silny, wyraźny, czoło pochyle); fragment części skalistej kości skroniowej lewej (duże rozmiary); fragment łuku jarzmowego (średniej grubości); fragmenty paliczek i kości śródreżca (nasady zosyfikowane); fragmenty trzonów kości długich (duże rozmiary, grube ściany kanałów jam szpikowych, silne przyczepy mięśniowe), w tym kość udowa (kresa chropawa wyraźna), kość piszczelowa (zaokrąglona krawędź przednia); fragmenty kręgów (masywne, zosyfikowane, brak osteofitów na brzegach); fragmenty nasad kości długich z różnych partii szkieletu (dość duże rozmiary, zwarta istota gąbczasta); fragmenty miednicy z okolicy panewki (dość duża średnica) i kości kulszowych (zosyfikowane, masywne); fragmenty żeber (dość duże rozmiary)	
111	693,3	popielato- beżowa	średni	<i>adultus/maturus</i> (ok. 35 lat)	?	kości płaskie ze sklepienia czaszki (średniej grubości, początek obliteracji szwów); fragment części skalistej lewej (nieduże rozmiary); fragment wyrostka kłykciowego żuchwy (małe rozmiary); trzony kości długich (ściany kanałów jam szpikowych średniej grubości, dość duże rozmiary); fragmenty nasad kości długich (zosyfikowane), w tym głowa kości udowej (istota gąbczasta dość zwarta); fragmenty paliczek (małe, gracylne, zosyfikowane)	kości niejednoznaczne morfologicznie
138	5,2	kremowo- beżowa	średni	dorosły	?	fragment trzonu żuchwy (gracylna, zobliterowana część zębodołów z okolicy trzonowców); pięć fragmentów kości długich (dość gracylne, ściany kanałów jam szpikowych średniej grubości)	kości mało diagnostyczne
139	701,8	beżowo- kremowa	średni	<i>maturus</i> (35–45 lat)	M?	kości płaskie ze sklepienia czaszki (dość grube, masywne, widoczny początek obliteracji szwów), w tym łuska potyliczna (kresa karkowa silna) oraz fragment górnej krawędzi prawego oczodołu (zaokrąglona); dwie części skaliste kości skroniowych (gracylne, nieduże rozmiary); pięć fragmentów korzeni zębów stałych (uformowane, niezbyt duże); fragment z okolicy wyrostków sutkowych kości skroniowych (dość masywne, wystające); wyrostek czołowy kości jarzmowej lewej (z guzkiem brzeżnym); fragment trzonu żuchwy (zębodoły po uzębieniu stałym); wyrostek dziobiasty żuchwy (dość duży); fragmenty nasad kości długich (istota gąbczasta lekko rozrzedzona); trzony kości długich (dość masywne; ściany kanałów jam szpikowych grube), w tym kość udowa (kresa chropawa silna)	dotatkowo wydzielono część skalistą kości skroniowej prawej (mała, gracylna) innej, niedorosłej osoby
227	534,5	beżowo- popielata	średni	wczesny <i>adultus</i> (ok. 20 lat)	F?	kości płaskie ze sklepienia czaszki (średniej grubości, szwy otwarte); fragment gałęzi żuchwy (wyrostek dziobiasty gracylny); sześć fragmentów korzeni zębów stałych (nieduże, uformowane); fragment wyrostka zębodołowego szczęki (łuk i zębodoły małe); fragmenty nasad kości długich (widoczne niedokostnienia); fragmenty trzonów kości długich (urzeźbienie średnie, rozmiary dość duże); fragmenty paliczek; fragmenty kręgów (gracylne)	ślady zielonych przebarwień na kościach
228	480,9	popielato- szare	średni	<i>adultus</i> (ok. 25 lat)	F?	kości płaskie ze sklepienia czaszki (dość cienkie, gracylne, szwy otwarte); część skalista kości skroniowej lewej (mała, gracylna); korzeń zęba stałego (nieduży, świeżo uformowany); wyrostek czołowy kości jarzmowej prawej (gracylny, bez guzka brzeżnego); fragmenty kręgów szyjnych (nieduże, brak osteofitów); fragmenty nasad kości długich (zwarta istota gąbczasta, zosyfikowane); trzony kości długich (urzeźbienie średnie, ściany kanałów jam szpikowych średniej grubości)	kość skroniowa lewa wraz z wyrostkiem sutkowym znacznie masywniejsza i większa od reszty (domieszana wtórnie?)
229	206,5	kremowy	dość silny	<i>infans I/II</i> (ok. 8 lat)	?	kości płaskie sklepienia czaszki (cienkie, gracylne, szwy obustronnie otwarte); fragment części skalistej kości skroniowej (nieduża); fragment korzenia zęba stałego? (gracylny, uformowany); trzony kości długich (cienkie ściany kanałów jam szpikowych, małe rozmiary)	kości niezbyt diagnostyczne
235	28,8	beżowo- kremowa	średni	<i>adultus-maturus</i> (25–45 lat)	?	fragmenty kości płaskich ze sklepienia czaszki (średniej grubości, gracylne); trzony kości długich (ściany kanałów jam szpikowych średniej grubości, urzeźbienie słabe), w tym kość piszczelowa (ostra krawędź przednia); fragmenty kręgów (zosyfikowane, brak zmian degeneracyjnych i przeciążeniowych)	kości niezbyt diagnostyczne
235	3,8	popielato- szara	dość silny	<i>phoetus/infans I</i>	?	kości płaskie ze sklepienia czaszki (bardzo cienkie, gracylne); dwie piramidy skaliste obu kości skroniowych (małe, gracylne, nieuformowane); dwa fragmenty zawiązków zębów mlecznych	dokładny wiek trudny do ustalenia (noworodek lub późny płód)
236	1	kremowo- biała	średni	dorosły (?)	?	fragment trzonu kości długiej (średnica dość duża, ściana kanału jamy szpikowej niezbyt gruba)	prawdopodobnie kość ramienne